

ПОДГОТОВКА ПАЦИЕНТОВ К ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ

Суточная РН-метрия:

- за четверо суток отменить ингибиторы протонного насоса: Париет, Омез, Омепразол
- за двое суток не принимать препараты, влияющие на внутрижелудочную кислотность.

Исследование проводится строго натощак (8-12 часов голодания, накануне исследования не принимать жидкость).

- с собой иметь:

- 1) полотенце
- 2) кружку
- 3) результаты ФГДС
- 4) результаты анализов на ВИЧ, RW, HCV, HbsAg.

Чреспищеводная кардиостимуляция (ЧПКС):

- исследование проводится натощак (8-12 часов голодания, накануне исследования не принимать жидкость).
- иметь результаты анализов на ВИЧ, RW, HCV, HbsAg.

Чреспищеводная ЭХО-КС:

- иметь результат ФГДС
- результаты анализов на ВИЧ, RW, HCV, HbsAg.

Спирография:

- Исследование проводится строго натощак (8-12 часов голодания, накануне исследования не принимать жидкость)

ЭКГ; ЭХО-КС; Стресс ЭХО-КС; ЭКГ-мониторирование; АД-мониторирование; Тредмил-тест; УЗДГ сосудов головного мозга, шеи, нижних конечностей; ЭЭГ (электроэнцефалография); УЭС (ультразвуковая энцефалоскопия); ЭНМГ(электронейромиография).

- подготовки пациенту не требуется